



Novalfarm Ltda.
Calidad, Ética y Servicio

NOVABRONCOL PETS®

NOVABRONCOL PETS es un expectorante de acción directa. Ejerce licuefacción del moco, elimina secreciones bronquiales en neumonía, laringitis, faringitis, síndrome respiratorio crónico.



*imágenes de envases son de referencia

USO VETERINARIO

Calle 2A # 69 F 14 - BOGOTÁ D.C. - PBX: 414 4531

www.novalfarm.com.co

30
AÑOS

COMPOSICIÓN:

Bromhexina HCl 0.24 g, Guaifenesina 2.0 g, Vehículo c.s.p 100 ml.

INDICACIONES:

NOVABRONCOL PETS, está indicado como **EXPECTORANTE y MUCOLÍTICO**, en afecciones broncopulmonares obstructivas de las vías aéreas, que muestran como parte de su sintomatología traqueobronquitis, bronquitis (agudas y crónicas), sinusitis. Como coadyuvante de la terapia antimicrobiana.



CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS:

NOVABRONCOL PETS, contiene Bromhexina, el cual es un expectorante de acción directa, que al ser administrado por vía oral, produce un aumento de la cantidad de secreciones traqueo-bronquiales y una disminución de su viscosidad fluidificándolas, debido a la destrucción de las fibras de mucopolisacáridos que son las que producen una secreción mucosa viscosa, facilitando así su eliminación. Por lo tanto, la Bromhexina posee acción expectorante y mucolítica a la vez. La Guaifenesina actúa como relajante de acción central ayudando a la expectoración y a la disminución del reflejo tusígeno sin llegar a inhibirlo. Este mecanismo combinado hace que la tos tenga menos posibilidad de instaurarse y si ya se ha presentado se reduzca, al no haber acumulación de secreciones en las vías respiratorias que induzcan esta.

IMPORTANCIA DEL EMPLEO DE BRONCOSECRETOLÍTICOS.

Existen un importante número de etiologías capaces de ocasionar afecciones respiratorias, estas incluyen agentes físicos, químicos y causas infecciosas. Sin importar la causa que las producen las afecciones respiratorias, tienen síntomas generales como irritación de la mucosa respiratoria, que ocasiona incremento anormal de las secreciones, pudiendo llegar a presentarse tos y complicaciones, si se deja avanzar el proceso hacia la cronicidad. No todas las afecciones del aparato respiratorio sobre todo, las que afectan su tramo superior requieren para su tratamiento, el empleo primario de antimicrobianos pero al contrario, el instaurar de modo temprano una terapia que incluya, el suministro de medicamentos expectorantes- mucolíticos contribuye eficazmente, en la resolución temprana de los cuadros respiratorios pudiendo evitarse así, graves complicaciones que pueden concluir en la presentación de cuadros neumónicos, que

pueden comprometer la vida del paciente. Un buen diagnóstico es fundamental para hacer manejo adecuado de las afecciones respiratorias, porque de este se parte para la toma de decisiones acertadas, en el momento de instaurar un tratamiento médico que ante la circunstancia presente, puede requerir la terapia combinada con antimicrobianos.

Novabroncol Pets se constituye en un medicamento de primera elección en el manejo de las afecciones respiratorias. Su agradable sabor hace los pacientes lo acepten mejor.

DOSIS Y FRECUENCIA DE ADMINISTRACIÓN:

- **PERROS DE RAZA PEQUEÑA Y CACHORROS.** (2 A 11kg de peso): De 0.8 a 4.5 ml. Por animal. Dos veces al día por 3 a 5 días.
- **PERROS DE RAZA MEDIANA** (12 A 22 Kg de peso): de 5 a 9 ml. Por animal. Dos veces al día, por 3 a 5 días.
- **PERROS DE RAZA GRANDE** (23 A 45 Kg de peso): De 9.5 a 18.5ml. Por animal. Dos veces al día, por 3 a 5 días.
- **GATOS:** Dependiendo la talla de animal de 0.5 ml. A 1.5ml. Por animal, dos veces al día durante 3 a 5 días.
- **PORCINOS:** Se puede administrar individualmente con jeringa evitando la aspiración pulmonar a las siguientes dosis: -
- **LECHONES:** De 4 a 8 ml. Por animal al día durante 3 a 5 días.
- **PORCINOS ADULTOS:** 21 ml. Por animal al día durante, 3 a 5 días. En forma práctica administrar en el agua de bebida a razón de 15 ml. De **NOVABRONCOL PETS** por litro de agua bebida de 3 a 5 días.

NOTA: en todos los casos en que el producto se administre en el agua, se debe preparar el agua medicada cada día.

CONTRAINDICACIONES: Ninguna conocida.

PRECAUCIONES:

- En caso necesario se deberá instaurar la terapia antimicrobiana adecuada.
- En animales para consumo humano no sacrificar sino hasta después de tres días de terminado el tratamiento.

PRESENTACIONES COMERCIALES: Frasco por 120 ml.

REGISTROS: ICA 6502 MV

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS