



Novalfarm Ltda.
Calidad, Ética y Servicio

NOVABRONCOL

Broncosecretolítico

NOVABRONCOL Ejerce licuefacción del moco, estimula la expectoración, elimina secreciones bronquiales en neumonía, laringitis, faringitis, síndrome respiratorio crónico. Mejora estado en reacciones post vacúnales.

*imágenes de envases son de referencia



USO VETERINARIO

Calle 2A # 69 F 14 - BOGOTÁ D.C. - PBX: 414 4531

www.novalfarm.com.co


**30
AÑOS**

COMPOSICION:

Eucaliptol 5 g, Bromhexina clorhidrato 0.25 g., Vehículo emulsificante c.s.p. 100 ml

INDICACIONES:

NOVABRONCOL, está indicado como **EXPECTORANTE** y **MUCOLÍTICO**, en afecciones broncopulmonares obstructivas de las vías aéreas, que muestran como parte de su sintomatología traqueobronquitis, bronquitis (agudas y crónicas), sinusitis. Como coadyuvante de la terapia antimicrobiana.



CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS:

NOVABRONCOL, contiene Bromhexina, el cual es un expectorante de acción directa, que al ser administrado por vía oral o inhalatoria, produce un sustancial aumento de la cantidad de secreciones traqueo - bronquiales y una disminución de su viscosidad - fluidificación - debido a la destrucción de las fibras de mucopolisacáridos que son las que producen una secreción mucosa viscosa, facilitando así su eliminación. Por lo tanto, la Bromhexina posee acción expectorante y mucolítica a la vez. Por vía inhalatoria **NOVABRONCOL**, produce un efecto inmediato.

Así mismo, **NOVABRONCOL**, contiene Eucaliptol, aceite esencial, de comprobado efecto mucolítico, expectorante y fluidificante de las secreciones bronquiales. Sumado a lo

anterior el eucaliptol posee propiedades antespasmódicas a nivel bronquial como acción antiséptica y antiinflamatoria.

VÍA, FRECUENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

INHALATORIA: Disolver 1 litro de NOVABRONCOL en 20 litros de agua. Nebulizar o fumar (preferiblemente en caliente), una vez al día durante 3 a 5 días o según criterio del Médico Veterinario.

ORAL: AVES: POLLOS DE ENGORDE Y POLLAS DE REPOSICIÓN: 0.5 ml por ave al día. En forma práctica: Disolver 1.5 a 2 Litros de NOVABRONCOL en el agua de bebida, por cada 5000 aves. Durante 3 a 5 días.

- **BOVINOS y EQUINOS:** Adultos: 40 a 50 ml por animal al día. Durante 3 a 5 días.

- **POTROS y BECERROS:** 12 a 25 ml por animal al día. Durante 3 a 5 días.

- **CERDOS ADULTOS:** 20 ml por animal al día. Durante 3 a 5 días.

- **LECHONES:** 4 ml por animal al día. Durante 3 a 5 días.

- **PERROS:** 2 a 8 ml por animal al día. Durante 3 a 5 días.

- **GATOS y CONEJOS:** 0.8 a 1 ml por animal al día. Durante 3 a 5 días.

NOTA: En todos los casos en que el producto se administre en el agua, se debe preparar el agua medicada cada día.

CONTRAINDICACIONES: Ninguna conocida.

PRECAUCIONES:

- En caso necesario se deberá instaurar la terapia antimicrobiana adecuada.

- En animales para consumo humano no sacrificar sino hasta después de tres días de terminado el tratamiento.

PRESENTACIONES COMERCIALES: Frasco por 120 ml, Garrafa por 1 L, Garrafa por 4 L, Garrafa por 20 L.

REGISTROS: ICA 4407 DB

ECUADOR: 6B-E-6457 - AGROCALIDAD

PERÚ: SENASA F.15.32.I.0020

REP. DOM.: 3595-2000

COSTA RICA: CO27-52-10-2148

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS