



Novalfarm Ltda.
Calidad, Ética y Servicio

NOVABISMOL

NOVABISMOL Control de diarreas producidas por enterotoxemias.
Protector de la mucosa intestinal.



*imágenes de envases son de referencia

USO VETERINARIO

Calle 2A # 69 F 14 - BOGOTÁ D.C. - PBX: 414 4531

www.novalfarm.com.co

**30
AÑOS**

COMPOSICION:

Cada 100 ml contienen: Subsalicilato de bismuto 2%, Agentes suspensores 12.8%, Preservantes, colorante, edulcorante c.s.p, Vehículo c.s.p. 100%.

INDICACIONES FARMACOLÓGICAS Y USOS TERAPÉUTICOS:

NOVABISMOL está indicado para el tratamiento y prevención de diarreas o inflamación gastrointestinal de origen inespecífico y desórdenes gastrointestinales en general. Control de diarreas producidas por hipersecreción causada por enterotoxemias.

NOVABISMOL actúa como protector de la mucosa intestinal disminuyendo la irritación y adsorbe las toxinas presentes en el tracto gastrointestinal de **BOVINOS, EQUINOS, PERROS y GATOS**.

NOVABISMOL contiene Subsalicilato de bismuto, el cual es un agente protector, adsorbente y astringente intestinal, capaz de formar una capa protectora en el intestino sobre la mucosa inflamada lo que impide la acción de sustancias irritantes sobre la misma. Comportándose así como agente antidiarréico. Es adsorbente, es decir, posee la propiedad de unir sustancias a su superficie, por lo que puede fijar toxinas bacterianas, irritantes, gases, además de actuar como protector; estas dos propiedades, protección y adsorción se encuentran juntas en este producto.



VÍA, DOSIS Y FRECUENCIA DE ADMINISTRACIÓN:

- Administrar por vía oral.

- La dosis del principio activo es de 20 a 22 mg por Kg. de peso vivo.

BOVINOS y EQUINOS: Adultos: De 100 a 250 ml de **NOVABISMOL** por animal, 3 veces al día.

- Potros y becerros: De 20 a 100 ml por animal, 3 veces al día.

- **PORCINOS:** 1 ml por Kg. de peso vivo 3 veces la día.

MASCOTAS

- **PERROS:**

De raza grande: De 15 a 25 ml por animal, 3 veces al día.

De raza mediana: De 5 a 15 ml por animal, 3 veces al día.

De raza pequeña: De 1 a 5 ml por animal, 3 veces al día.

- **GATOS:** De 1 a 5 ml por animal, 3 veces al día.

La dosis puede repetirse hasta completa recuperación.

En forma práctica, administrar 1 ml de **NOVABISMOL** por Kg. de peso vivo, en todas las especies, 3 veces al día.

RECOMENDACIONES:

Puede administrarse con jeringa o sonda evitando la aspiración pulmonar.

Si los síntomas persisten después del uso del producto por 2 a 3 días, consulte al médico veterinario.

CONTRAINDICACIONES: Ninguna conocida.

PRESENTACIONES COMERCIALES: Frasco por 120 ml, Garrafa por 1 L, Garrafa por 4 L.

REGISTROS: ICA 5211 DB

ECUADOR: 5G-8742 - AGROCALIDAD

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
